

Aide au codage PMSI — codes trouvés

Catalogue « EOH » — Liste des codes CIM 10 utiles pour une équipe d'hygiéniste... type EOH

11 code(s) trouvé(s). Export du 2026-09-10 00:46:51. Document pédagogique : les libellés et tarifs font foi dans les référentiels officiels (ATIH, ameli)
Ce document en ligne (QR code ci-contre) : <https://aideaucodage.docteurhouyengah.com/catalogue/1/export.pdf>



CIM10 — CIM-10 (diagnostics)

CIM10 T814	Infection après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classée ailleurs catégorie : T81 · chapitre : Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes · groupe : T80-T88 · libelle groupe : Complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs · type mco : 1 - interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · inclusions et notes cocoa : Abscès de(s) :  intra-abdominal  plaie après un acte à visée diagnostique et thérapeutique  sous-phrénique  sutures Sepsis après un acte à visée diagnostique et thérapeutique Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier d'autres manifestations de l'infection, comme le sepsis ou l'abcès. À l'exclusion de infection (due à) :  injection thérapeutique, perfusion et transfusion (T80.2)  plaie chirurgicale obstétricale (O86.0)  prothèses, implants et greffes (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5- T84.7, T85.7) Une infection sur sonde urinaire associe le code T83.5 et non T81.4 à celui de l'infection (AGORA - # 74695 le 30 janvier 2013)
CIM10 U82100	Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline [SARM], situation d'infection catégorie : U82 · chapitre : Codes d'utilisation particulière · groupe : U82-U85 · libelle groupe : Résistance aux médicaments antimicrobiens et antinéoplasiques · type mco : 1 - interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif
CIM10 U82101	Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline [SARM], situation de portage sain catégorie : U82 · chapitre : Codes d'utilisation particulière · groupe : U82-U85 · libelle groupe : Résistance aux médicaments antimicrobiens et antinéoplasiques · type mco : 1 - interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif
CIM10 U822+0	Résistance par bêta-lactamases à spectre étendu [BLSE], situation d'infection catégorie : U82 · chapitre : Codes d'utilisation particulière · groupe : U82-U85 · libelle groupe : Résistance aux médicaments antimicrobiens et antinéoplasiques · type mco : 1 - interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif
CIM10 U822+1	Résistance par bêta-lactamases à spectre étendu [BLSE], situation de portage sain catégorie : U82 · chapitre : Codes d'utilisation particulière · groupe : U82-U85 · libelle groupe : Résistance aux médicaments antimicrobiens et antinéoplasiques · type mco : 1 - interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif
CIM10 U8371	Bactérie multirésistante [BMR] catégorie : U83 · chapitre : Codes d'utilisation particulière · groupe : U82-U85 · libelle groupe : Résistance aux médicaments antimicrobiens et antinéoplasiques · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de résistance par bêta-lactamases à spectre étendu [BLSE] (subdivisions de U82.2) Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline [SARM] (subdivisions de U82.10) la résistance aux antibiotiques des bactéries productrices de céphalosporinase de haut niveau (HCASE) est codée avec la catégorie U83.71 (AGORA - # 139692 le 7 novembre 2016) Multirésistance Le code U83.71— Bactérie multirésistante [BMR] doit être employé pour coder la présence d'une bactérie multirésistante, c'est-à-dire une bactérie caractérisée comme telle par le laboratoire de bactériologie ou selon les critères du CLIN de l'établissement, sauf dans les cas où cette situation de multirésistance de type BMR est spécifiquement décrite par un autre code. Ainsi, une résistance par bêta-lactamases à spectre étendu se code U82.2— Résistance par bêta-lactamases à spectre étendu [BLSE] et non U83.71—. La seule présence de plusieurs résistances sans mention de BMR n'autorise pas le code U83.71—. Dans les situations où un germe présente plusieurs résistances qui répondent aux conditions de codage mais qui ne correspondent pas à une situation de BMR telle que définie ci-dessus, on recommande de coder chaque résistance individuellement. Exemples : Endocardite à Pseudomonas aeruginosa multirésistant : I33.0, B96.5, U83.710 Colonisation nasale par Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline [SARM] ayant entraîné des mesures d'isolement et de décontamination : U82.101, Z22.3, Z29.0. ATIH – - FASCICULE DE CODAGE POUR LE PMSI - Maladies infectieuses - Mise à jour 2023, p. 4 3 SMR U83.710 Bactérie multirésistante [BMR], situation d'infection U83.711 Bactérie multirésistante [BMR], situation de portage sain
CIM10 U83710	Bactérie multirésistante [BMR], situation d'infection catégorie : U83 · chapitre : Codes d'utilisation particulière · groupe : U82-U85 · libelle groupe : Résistance aux médicaments antimicrobiens et antinéoplasiques · type mco : 1 - interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif
CIM10 U83711	Bactérie multirésistante [BMR], situation de portage sain catégorie : U83 · chapitre : Codes d'utilisation particulière · groupe : U82-U85 · libelle groupe : Résistance aux médicaments antimicrobiens et antinéoplasiques · type mco : 1 - interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif
CIM10 Y95	Facteurs nosocomiaux catégorie : Y95 · chapitre : Causes externes de morbidité et de mortalité · groupe : Y90-Y98 · libelle groupe : Facteurs supplémentaires se rapportant aux causes de morbidité et de mortalité classées ailleurs · type mco : 2 - interdit en DP et DR · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Infections associées aux soins Le codage des complications infectieuses des actes et des dispositifs médicaux suit les règles habituelles préconisées par l'OMS (cf. CIM-10, volume 2) : c'est le code de la nature de cette infection qui est l'affectation principale. On y associe, en DAS, certains codes des catégories T80 à T88 du chapitre XIX de la CIM 10 et un code des catégories Y83 ou Y84 du chapitre XX de la CIM-10 Actes chirurgicaux et autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention, complété si besoin par un code des catégories B95-B98 pour identifier le germe. En application de la règle générale rappelée ci-dessus, un code T peut être placé en DP (exemple : T87.4 Infection d'un moignon d'amputation). Le caractère nosocomial d'une infection autorise l'utilisation du code Y95 facteurs nosocomiaux. ATIH - FASCICULE DE CODAGE POUR LE PMSI - Maladies infectieuses - Mise à jour 2023, juin 2023, pp. 10-11
CIM10 Z223	Sujet porteur d'autres maladies bactériennes précisées catégorie : Z22 · chapitre : Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé · groupe : Z20-Z29 · libelle groupe : Sujets pouvant courir un risque lié à des maladies transmissibles · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : ONO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Sujet porteur d'une maladie bactérienne due à des :  méningocoques  staphylocoques  streptocoques Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (U82–U83) pour identifier une résistance de l'agent infectieux aux médicaments antimicrobiens. Colonisation de cathéter à Corynébactéries sans septicémie (sepsis) : la colonisation n'étant pas une infection vous ne pouvez pas employer T82.7. Z22.3 est le code adéquat. (AGORA - # 62715 le 24 avril 2012) – colonisation nasale par Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline [SARM] ayant entraîné des mesures d'isolement et de décontamination : Z22.3, Z29.0, U82.101. Guide méthodologique de production des informations relatives à l'activité médicale et à sa facturation en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie – BO du 29 avril 2026, pp 114-115
CIM10 Z290	Isolement (prophylactique) catégorie : Z29 · chapitre : Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé · groupe : Z20-Z29 · libelle groupe : Sujets pouvant courir un risque lié à des maladies transmissibles · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : NNO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · cma smr (cocoa) : oui · inclusions et notes cocoa : Admission pour protéger le sujet de son milieu ou pour l'isoler après un contact avec une personne atteinte d'une maladie infectieuse La catégorie Z290 comprend certaines mesures de prévention :  la sous-catégorie Z29.0 Isolement n'est pas destinée au classement des situations d'isolement social qui doivent être codées avec la catégorie Z60 le code Z29.0 est destiné au codage de l'isolement dans un but thérapeutique, tel qu'il s'en réalise pour des sujets atteints d'une maladie infectieuse contagieuse ou bien susceptibles de contracter une telle maladie. Bien que la catégorie Z29 soit classée dans un groupe (Z20–Z29) qui concerne les maladies infectieuses, l'absence d'un autre code d'isolement dans le chapitre XXI conduit à autoriser l'emploi de Z29.0 dans toutes les situations où un patient est isolé pour être mis à l'abri de l'entourage ou pour mettre celui-ci à l'abri du patient. Guide méthodologique de production des informations relatives à l'activité médicale et à sa facturation en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie – BO du 29 avril 2026, p. 95 En soins de suite et de réadaptation le Guide méthodologique spécifie que le code Z29.0 est utilisé dans le cadre des isolements thérapeutiques de type infectieux : « le code Z29.0 est destiné au codage de l'isolement dans un but thérapeutique (pour des sujets atteints d'une maladie infectieuse contagieuse ou bien susceptibles de contracter

une telle maladie). ». Le code Z29.0 ne peut pas être utilisé dans d'autres situations. (AGORA - # 177862 le 15 avril 2019) | – colonisation nasale par *Staphylococcus aureus* résistant à la méthicilline [SARM] ayant entraîné des mesures d'isolement et de décontamination : Z22.3, Z29.0, U82.101. | Guide méthodologique de production des informations relatives à l'activité médicale et à sa facturation en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie – BO du 29 avril 2026, pp 114-115 | Immunothérapie prophylactique | Administration d'immunoglobuline | Z29.1 ou Z29.2 peuvent être utilisés lors des séjours motivés par l'administration d'une immunothérapie ou d'une chimiothérapie prophylactique, quel qu'en soit le motif (infectieux, tumoral...), mais à condition que le caractère prophylactique (préventif) soit établi. | Guide méthodologique de production des informations relatives à l'activité médicale et à sa facturation en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie – BO du 29 avril 2026, p. 95
