Aide au codage PMSI — codes trouvés

Catalogue « HAD_IK » — Indice de Karnofsky en HAD

Catalogue mis à jour le 2026-09-11 22:29:25

10 code(s). Export du 2026-11-08 19:13:39. Document pédagogique : les libellés et tarifs font foi dans les référentiels officiels (ATIH, ameli).
Ce document en ligne (QR code ci-contre) : https://aideaucodage.docteurhouyengah.com/catalogue/9/export.pdf

HAD
IK10

Moribond, processus fatal progressant rapidement

famille : indice de Karnofsky · valeur pmsi : 10 · ponderation ik : 2.1 · contenu (guide had) : Pondération IK par classe : 90-100 > 1, 70-80 > 1.23, 60 > 1.44, 50 > 1.71, 40 > 1.85, 30 > 1.91, 10-20 > 2.1

Commentaire (2026-09-12 12:06:18) : L'indice de Karnofsky (IK) a été développé en cancérologie pour décrire, sur une échelle générique synthétique de 0 (signifiant décès) à 100 % (signifiant aucun signe ou symptôme de maladie), l'état de santé global du patient, l'aide dont il a besoin pour les gestes de la vie courante (besoins personnels, habillage, etc.) et les soins médicaux qu'il requiert.
Les patients pris en charge en HAD ont un IK variant de 10 % (« moribond ») à une autonomie quasi-totale (90-100 %104). Remarque : bien que la grille des activités de la vie quotidienne AVQ (cf. appendice I) et l'IK soient utilisés en HAD pour évaluer la dépendance du patient, il n'existe pas de correspondance établie entre les deux échelles. (Extrait guide Méthodologique HAD 2026)

HAD
IK20

Très malade, hospitalisation et soins de support nécessaires

famille : indice de Karnofsky · valeur pmsi : 20 · ponderation ik : 2.1 · contenu (guide had) : Pondération IK par classe : 90-100 > 1, 70-80 > 1.23, 60 > 1.44, 50 > 1.71, 40 > 1.85, 30 > 1.91, 10-20 > 2.1

Commentaire (2026-09-12 12:06:36) : L'indice de Karnofsky (IK) a été développé en cancérologie pour décrire, sur une échelle générique synthétique de 0 (signifiant décès) à 100 % (signifiant aucun signe ou symptôme de maladie), l'état de santé global du patient, l'aide dont il a besoin pour les gestes de la vie courante (besoins personnels, habillage, etc.) et les soins médicaux qu'il requiert.
Les patients pris en charge en HAD ont un IK variant de 10 % (« moribond ») à une autonomie quasi-totale (90-100 %104). Remarque : bien que la grille des activités de la vie quotidienne AVQ (cf. appendice I) et l'IK soient utilisés en HAD pour évaluer la dépendance du patient, il n'existe pas de correspondance établie entre les deux échelles. (Extrait guide Méthodologique HAD 2026)

HAD
IK30

Sévèrement handicapé, hospitalisation indiquée

famille : indice de Karnofsky · valeur pmsi : 30 · ponderation ik : 1.91 · contenu (guide had) : Pondération IK par classe : 90-100 > 1, 70-80 > 1.23, 60 > 1.44, 50 > 1.71, 40 > 1.85, 30 > 1.91, 10-20 > 2.1

Commentaire (2026-09-12 12:06:46) : L'indice de Karnofsky (IK) a été développé en cancérologie pour décrire, sur une échelle générique synthétique de 0 (signifiant décès) à 100 % (signifiant aucun signe ou symptôme de maladie), l'état de santé global du patient, l'aide dont il a besoin pour les gestes de la vie courante (besoins personnels, habillage, etc.) et les soins médicaux qu'il requiert.
Les patients pris en charge en HAD ont un IK variant de 10 % (« moribond ») à une autonomie quasi-totale (90-100 %104). Remarque : bien que la grille des activités de la vie quotidienne AVQ (cf. appendice I) et l'IK soient utilisés en HAD pour évaluer la dépendance du patient, il n'existe pas de correspondance établie entre les deux échelles. (Extrait guide Méthodologique HAD 2026)

HAD
IK40

Handicapé, nécessite des soins et une aide spéciale

famille : indice de Karnofsky · valeur pmsi : 40 · ponderation ik : 1.85 · contenu (guide had) : Pondération IK par classe : 90-100 > 1, 70-80 > 1.23, 60 > 1.44, 50 > 1.71, 40 > 1.85, 30 > 1.91, 10-20 > 2.1

Commentaire (2026-09-12 12:06:55) : L'indice de Karnofsky (IK) a été développé en cancérologie pour décrire, sur une échelle générique synthétique de 0 (signifiant décès) à 100 % (signifiant aucun signe ou symptôme de maladie), l'état de santé global du patient, l'aide dont il a besoin pour les gestes de la vie courante (besoins personnels, habillage, etc.) et les soins médicaux qu'il requiert.
Les patients pris en charge en HAD ont un IK variant de 10 % (« moribond ») à une autonomie quasi-totale (90-100 %104). Remarque : bien que la grille des activités de la vie quotidienne AVQ (cf. appendice I) et l'IK soient utilisés en HAD pour évaluer la dépendance du patient, il n'existe pas de correspondance établie entre les deux échelles. (Extrait guide Méthodologique HAD 2026)

HAD
IK50

Nécessite une aide importante et des soins médicaux fréquents

famille : indice de Karnofsky · valeur pmsi : 50 · ponderation ik : 1.71 · contenu (guide had) : Pondération IK par classe : 90-100 > 1, 70-80 > 1.23, 60 > 1.44, 50 > 1.71, 40 > 1.85, 30 > 1.91, 10-20 > 2.1

Commentaire (2026-09-12 12:07:10) : L'indice de Karnofsky (IK) a été développé en cancérologie pour décrire, sur une échelle générique synthétique de 0 (signifiant décès) à 100 % (signifiant aucun signe ou symptôme de maladie), l'état de santé global du patient, l'aide dont il a besoin pour les gestes de la vie courante (besoins personnels, habillage, etc.) et les soins médicaux qu'il requiert.
Les patients pris en charge en HAD ont un IK variant de 10 % (« moribond ») à une autonomie quasi-totale (90-100 %104). Remarque : bien que la grille des activités de la vie quotidienne AVQ (cf. appendice I) et l'IK soient utilisés en HAD pour évaluer la dépendance du patient, il n'existe pas de correspondance établie entre les deux échelles. (Extrait guide Méthodologique HAD 2026)

HAD
IK60

Nécessite une aide occasionnelle, capable de la plupart des soins personnels

famille : indice de Karnofsky · valeur pmsi : 60 · ponderation ik : 1.44 · contenu (guide had) : Pondération IK par classe : 90-100 > 1, 70-80 > 1.23, 60 > 1.44, 50 > 1.71, 40 > 1.85, 30 > 1.91, 10-20 > 2.1

Commentaire (2026-09-12 12:07:19) : L'indice de Karnofsky (IK) a été développé en cancérologie pour décrire, sur une échelle générique synthétique de 0 (signifiant décès) à 100 % (signifiant aucun signe ou symptôme de maladie), l'état de santé global du patient, l'aide dont il a besoin pour les gestes de la vie courante (besoins personnels, habillage, etc.) et les soins médicaux qu'il requiert.
Les patients pris en charge en HAD ont un IK variant de 10 % (« moribond ») à une autonomie quasi-totale (90-100 %104). Remarque : bien que la grille des activités de la vie quotidienne AVQ (cf. appendice I) et l'IK soient utilisés en HAD pour évaluer la dépendance du patient, il n'existe pas de correspondance établie entre les deux échelles. (Extrait guide Méthodologique HAD 2026)

HAD
IK70

Autonome, incapable d'une activité normale ou de travailler

famille : indice de Karnofsky · valeur pmsi : 70 · ponderation ik : 1.23 · contenu (guide had) : Pondération IK par classe : 90-100 > 1, 70-80 > 1.23, 60 > 1.44, 50 > 1.71, 40 > 1.85, 30 > 1.91, 10-20 > 2.1

Commentaire (2026-09-12 12:07:33) : L'indice de Karnofsky (IK) a été développé en cancérologie pour décrire, sur une échelle générique synthétique de 0 (signifiant décès) à 100 % (signifiant aucun signe ou symptôme de maladie), l'état de santé global du patient, l'aide dont il a besoin pour les gestes de la vie courante (besoins personnels, habillage, etc.) et les soins médicaux qu'il requiert.
Les patients pris en charge en HAD ont un IK variant de 10 % (« moribond ») à une autonomie quasi-totale (90-100 %104). Remarque : bien que la grille des activités de la vie quotidienne AVQ (cf. appendice I) et l'IK soient utilisés en HAD pour évaluer la dépendance du patient, il n'existe pas de correspondance établie entre les deux échelles. (Extrait guide Méthodologique HAD 2026)

HAD
IK80

Activité normale avec effort, quelques symptômes ou signes

famille : indice de Karnofsky · valeur pmsi : 80 · ponderation ik : 1.23 · contenu (guide had) : Pondération IK par classe : 90-100 > 1, 70-80 > 1.23, 60 > 1.44, 50 > 1.71, 40 > 1.85, 30 > 1.91, 10-20 > 2.1

Commentaire (2026-09-12 12:07:41) : L'indice de Karnofsky (IK) a été développé en cancérologie pour décrire, sur une échelle générique synthétique de 0 (signifiant décès) à 100 % (signifiant aucun signe ou symptôme de maladie), l'état de santé global du patient, l'aide dont il a besoin pour les gestes de la vie courante (besoins personnels, habillage, etc.) et les soins médicaux qu'il requiert.
Les patients pris en charge en HAD ont un IK variant de 10 % (« moribond ») à une autonomie quasi-totale (90-100 %104). Remarque : bien que la grille des activités de la vie quotidienne AVQ (cf. appendice I) et l'IK soient utilisés en HAD pour évaluer la dépendance du patient, il n'existe pas de correspondance établie entre les deux échelles. (Extrait guide Méthodologique HAD 2026)

HAD
IK90

Capable d'une activité normale, symptômes ou signes mineurs

famille : indice de Karnofsky · valeur pmsi : 90 · ponderation ik : 1 · contenu (guide had) : Pondération IK par classe : 90-100 > 1, 70-80 > 1.23, 60 > 1.44, 50 > 1.71, 40 > 1.85, 30 > 1.91, 10-20 > 2.1

Commentaire (2026-09-12 12:07:50) : L'indice de Karnofsky (IK) a été développé en cancérologie pour décrire, sur une échelle générique synthétique de 0 (signifiant décès) à 100 % (signifiant aucun signe ou symptôme de maladie), l'état de santé global du patient, l'aide dont il a besoin pour les gestes de la vie courante (besoins personnels, habillage, etc.) et les soins médicaux qu'il requiert.
Les patients pris en charge en HAD ont un IK variant de 10 % (« moribond ») à une autonomie quasi-totale (90-100 %104). Remarque : bien que la grille des activités de la vie quotidienne AVQ (cf. appendice I) et l'IK soient utilisés en HAD pour évaluer la dépendance du patient, il n'existe pas de correspondance établie entre les deux échelles. (Extrait guide Méthodologique HAD 2026)

HAD
IK100

Normal, aucune plainte, aucun signe de maladie

famille : indice de Karnofsky · valeur pmsi : 100 · ponderation ik : 1 · contenu (guide had) : Pondération IK par classe : 90-100 > 1, 70-80 > 1.23, 60 > 1.44, 50 > 1.71, 40 > 1.85, 30 > 1.91, 10-20 > 2.1